

## Дупель – *Gallinago media* (Latham, 1787)



**Отряд** Ржанкообразные – *Charadriiformes*

**Семейство** Бекасовые – *Scolopacidae*


**Статус и категория редкости в пределах Брянской области.** Сокращающийся в численности вид. 2 категория.

**Статус вида на территории страны и соседних субъектов Российской Федерации.** Вид занесён в Красную книгу Калужской области (3).

**Краткое описание.** Размером с дрозда или несколько крупнее. Крайние рулевые перья белые. Взрослая птица весьма сходна с бекасом. В качестве отличия может служить то, что на средних кроющих крыла хорошо развиты белые вершины (шире, чем у бекаса). Охотники узнают дупеля также по несколько более сильной испещрённой нижней стороне тела. Молодая птица сходна с взрослой, но верхняя сторона окрашена несколько однообразнее, так как светлые края перьев уже. Крайние рулевые перья в дымчатых пятнах. Полёт низкий, прямой, относительно медленный и тяжёлый, взлетает, в отличие от бекаса, чаще молча. Масса – 180–250 г, длина тела – 27–29 см, размах крыльев – 42–46 см.

**Распространение.** Ареал простирается от Европы до западной части Северной Азии. Гнездится в европейской части России практически до берегов Баренцева и Белого морей. В области на гнездовании отмечен в 15 районах: Брянский, Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, Злынковский, Клетнянский, Клинцовский, Климовский, Навлинский, Новозыбковский, Рогнединский, Суземский, Суражский, Трубчевский и Унечский.

**Места обитания и биология.** Перелётный вид. Предпочитает низкотравные сырые кочкарные луга, реже – болота. Полигам. Сразу после прилёта самцы приступают к токованию, которое происходит по ночам и в сумерках. Гнездо самка устраивает на земле, на относительно сухом месте – в негустом пойменном лесу, зарослях кустарников. В кладке обычно 4 яйца. Насиживание продолжается 22–24 дня. Птенцы начинают летать в возрасте около 3 недель. Основу питания составляют черви, личинки насекомых и другие беспозвоночные.



**Численность, лимитирующие факторы и угрозы.** Редкий вид. Численность не установлена. С 2004 по 2016 гг. опубликованы данные только о 5 встречах [17, 21, 45].

Лимитирующие факторы: распашка пойменных земель, мелиорация, зарегулирование русел рек, выпас скота в местах гнездования, раннее сенокошение, охота [79].

**Принятые и необходимые меры охраны.** Места токования охраняются в охранной зоне ГПБЗ «Брянский лес» [79]. Запрет весенней охоты. Соблюдение режима ООПТ.

**Источники информации:** 8, 17, 21, 45, 79, 96, 114.

**Составители:** И. А. Прокофьев, С. С. Голощанова.

**Фото:** И. П. Шпиленок.